



Milano bailarín

Elanus leucurus


De dorso gris azulado, frente blanca y plumas cobertoras alares negras. Blanco por debajo con una pequeña mancha circular negra en cada ala. Cola blanca con rectrices centrales grises por encima, patas amarillas e iris rojo. Mide de 40 a 44 cm de longitud y pesa entre 250 y 300 g. Es característico su vuelo batido suave rectilíneo y estacionario batido.

Se distribuye de Tarapacá a Aysén. Habita praderas abiertas, áreas agrícolas con árboles dispersos, áreas urbanas y suburbanas, y algunos tipos de humedales (ñadis, mallines, vegetación ribereña, vegas y juncuales). Usualmente bajo los 1.000 msn.

Solitario o forma pareja, diurno con actividad crepuscular. Se reproduce en primavera, son monógamos, construye nidos en árboles, o en nidos abandonados por otras aves, de estructura de tipo copa, y los elabora con pequeñas ramas y los reviste con material más fino; localizado, por lo general, en un arbusto o árbol más bien aislado, los huevos son incubados por la hembra por 28 a 32 días.

Se alimenta principalmente de roedores (98% de la dieta), tanto nativos (84%) como introducidos como guarenes, ratas negras y lauchas (14%). Observa sus presas suspendido desde el aire, y se lanza rápidamente sobre ellas, las captura y las traslada a un árbol o risco para comérselas. Caza temprano por la mañana, al amanecer, y por la tarde en el crepúsculo.

Muchos de los hábitats que ocupa le ofrecen presas (ratones) pero no áreas de nidificación, por falta de árboles adecuados, especialmente en plantaciones forestales y cultivos agrícolas intensivos.



Texto: Andrés Muñoz Pedrero. Ilustración Jorge Ruiz Tromel. Diseño: Carla Vásquez Arenas.

Financiado por:



@equipaje_del_naturalista



Equipaje del Naturalista

